



???, ?????, ?????, ?????, ?????, ???, ?????, ??, ?????

Capsicum

Σε αυτήν τη μελέτη αξιολογήθηκε η επίδραση της διαφυλλικής εφαρμογής νιτρικού καλίου σε πιπεριές (*Capsicum spp.*) σε ποσοστό 5,6 kg KNO₃/ha, σε διαστήματα δύο εβδομάδων από την ανθοφορία μέχρι τη συγκομιδή. Οι διαφυλλικές εφαρμογές πραγματοποιήθηκαν κατά την ανθοφορία, 2 εβδομάδες αργότερα, 4 εβδομάδες αργότερα και 6 εβδομάδες αργότερα. Σε μια άλλη θεραπεία έγινε εφαρμογή και τις τέσσερις φορές, ενώ σε έναν μάρτυρα χωρίς θεραπεία δεν εφαρμόστηκε νιτρικό κάλιο. Η δοκιμή διεξήχθη σε πλήρεις τυχαιοποιημένες ομάδες σε ελεύθερη διάταξη με πέντε όμοιες καλλιέργειες. Οι συνολικές αποδόσεις ήταν υψηλότερες στη θεραπεία στην οποία εφαρμόστηκε νιτρικό κάλιο κάθε 2 εβδομάδες για οκτώ εβδομάδες. Η θεραπεία με τον μάρτυρα (χωρίς θεραπεία) είχε τις χαμηλότερες αποδόσεις.