



Fenofazy truskawki i wymogi w zakresie nawożenia

Zalecane proporcje N-P-K-Ca-Mg przy fertygacji przez nawadnianie kropłowe, w głównych fazach wzrostu truskawek z upraw polowych, o żywotności 210 dni, przy oczekiwanym plonie 25–30 t/ha.

Dni po przesadzeniu i faza fenologiczna	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O:CaO:MgO				Argumentacja
0 - 70 kielkowanie i wzrost wegetatywny	N	1	P ₂ O ₅	0,58	Stosunkowo duże zapotrzebowanie na wszystkie składniki odżywcze do ugruntowania systemu korzeniowego i zbudowania biomasy pędów
	K ₂ O	1,3	CaO	1,13	
	MgO	1,05			
71-75 1. fala: kwitnienie i zawiązywanie się owoców	N	1	P ₂ O ₅	0,30	Niższe zapotrzebowanie na P ze względu na rozwinięty już system korzeniowy; wysokie zapotrzebowanie na K do zawiązywania owoców; ciągłe zapotrzebowanie na Ca i Mg dla organów wegetatywnych
	K ₂ O	0,91	CaO	1,04	
	MgO	0,55			
76 - 119 1. fala: wzrost owoców	N	1	P ₂ O ₅	0,28	Wysokie zapotrzebowanie na K do zawiązywania owoców i powiększania ich objętości; ciągłe zapotrzebowanie na Ca i Mg dla organów wegetatywnych
	K ₂ O	0,84	CaO	1,0	
	MgO	0,51			
120 - 165 2. - 3. fala: zawiązywanie się owoców i wzrost owoców	N	1	P ₂ O ₅	0,28	Wyższe zapotrzebowanie na P, teraz do produkcji nasiennej; wysokie zapotrzebowanie na K do zawiązywania owoców i powiększania ich objętości; ciągłe zapotrzebowanie na Ca i Mg dla organów wegetatywnych
	K ₂ O	0,84	CaO	1,0	
	MgO	0,51			
166 - 210 4. fala: zawiązywanie się owoców i wzrost owoców	N	1	P ₂ O ₅	0,40	
	K ₂ O	1,05	CaO	1,4	
	MgO	0,78			
Całkowita dawka (kg/ha)	N	142	P ₂ O ₅	100	
	K ₂ O	260	CaO	95	
	MgO	72			



-TRUSKAWKI



Jako główne źródło potasu i źródło części azotu należy stosować azotan potasu. Bilans azotu powinien pochodzić z azotanu wapnia, azotanu magnezu i azotanu amonu, w oparciu o powyższe dawki zależne od fazy.